

Neoholopterus antarcticus

Aurivillius, 1910

Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae



Descripción General

Mide unos 19 mm. La descripción fue realizada con el macho.

Coloración ferrugínea clara en costados del meso y metasterno, ápice de las tibias, élitros (excepto su base) y antenas (excepto escapo que es más pardo); la pubescencia es fina, blanquecina y sedosa. La cabeza es absolutamente punteada, surcada entre los ojos. El tórax es algo más corto que ancho en la base, adelante muy estrechado y tuberculado en cada uno de sus lados y encima. El escudete es triangular. Los élitros son en la base algo más anchos que en el pronoto, un poco más estrechado entre tubérculos, dehiscentes, atrás lineares y en el ápice obtusos; encima llevan dos costillas de las cuales la interna es abreviada. Las antenas son algo más cortas que el cuerpo, comprimidas, artículos 5 y 11 del lado externo finamente dentados, ápice anguloso. Escapo dentado en serrucho y ligeramente encorvado alcanza al pronoto.

Hábitat y rol trófico

Especie de extrema rareza y con escasas colectas de ejemplares desde su descripción. Se encuentra en la estepa patagónica e investigadores especulan una asociación con el arbusto leñoso Mata negra.

Corre riesgo de extinción debido a la pérdida de hábitat, distribución restringida y escasa densidad poblacional natural.

