

Hyles annei

(Guérin, 1839)

Esfíngido

Orden: **Lepidoptera**
Familia: **Sphingidae**



Descripción General

Polillas grandes con envergadura alar de 70-105 mm. Cabeza con ojos grandes, antenas gruesas, con bandas blancas laterales confluyendo, las cuales se proyectan a cada lado del tórax hasta sus bordes posteriores, devolviéndose por su parte interna hasta su porción delantera, donde terminan. Tórax subcuadrado con abundante pilosidad pardo olivácea. Abdomen fuerte, ancho y cónico, con franja dorsal pardo olivácea, con líneas transversales negras y blancas. Primer par de alas más grande que el segundo; primer par con bandas longitudinales castaño oscuro y gris, el segundo par es rojo pálido en el centro y negro en la base y borde exterior.

Larvas son gruesas de aspecto carnososo, sin pelos, de colores verde y negro; al término del abdomen, en el ápice dorsal, llevan un proceso en forma de cuerno agudo, blando, de color castaño rojizo.

Hábitat y rol trófico

En la zona central de Chile, los adultos emergen entre agosto y septiembre; en el norte chico están presentes todo el año. La hembra coloca los huevos en forma aislada sobre hojas de Solanaceas. El periodo de incubación es de 8-12 días. Las larvas son voraces aumentando rápidamente de tamaño. Una vez terminado el desarrollo larval migran al suelo para pupar, ubicándose bajo la hojarasca.

