

Butleria flavomaculata

(Blanchard, 1852)

Hesperia de alas manchadas del norte

Orden: **Lepidoptera**

Familia: **Hesperiidae**



Descripción General

Pequeña mariposa con envergadura alar de 20 a 23mm. Cabeza peluda, menos ancha que el tórax, con antenas largas terminadas en un ensanchamiento curvado y agudo. Tórax cubierto de pilosidad castaño oscuro. Abdomen delgado más largo que la cabeza y el tórax juntos, con un penacho de pelos en su extremo. Cuerpo y alas de color castaño oscuro, con reflejos violáceos y pequeñas manchas amarillo anaranjado sobre ambos pares de alas.

Hábitat y rol trófico

Las larvas construyen capullos con las hojas tiernas de su hospedero, ocultándose dentro de éstos, incluso cuando se alimentan. Alcanzan los 2 cm de longitud.

Las crisálidas se fijan en la cara dorsal de las hojas mediante un hilo fino manteniéndose con la cabeza hacia arriba. Los adultos tardan 16 días en abandonar el estado de crisálida. Se encuentran durante gran parte del verano. Las larvas se encuentran defoliando carrizo. Los adultos nectívoros vuelan sobre praderas y en lugares abiertos de bosques y matorrales.

